



## Preparación para la realización de una Cistoscopia

PARTE DE *Bupa*

Para la correcta realización de la prueba debe:

- Tomará **Ciprofloxacino 500 mg**, 1/12 horas el día antes de la exploración, el mismo día y tres días después.
- No precisa ayuna, excepto si se realiza con sedación donde son necesarias 6 horas de ayuno.

Por favor, si tiene alergias a **Ciprofloxacino** lo debe comunicar al médico para que le prescriba otra profilaxis antibiótica

Fecha de la prueba: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_, a las \_\_\_\_\_



## Preparación para la realización de una Cistoscopia

PARTE DE *Bupa*

Para la correcta realización de la prueba debe:

- Tomará **Ciprofloxacino 500 mg**, 1/12 horas el día antes de la exploración, el mismo día y tres días después.
- No precisa ayuna, excepto si se realiza con sedación donde son necesarias 6 horas de ayuno.

Por favor, si tiene alergias a **Ciprofloxacino** lo debe comunicar al médico para que le prescriba otra profilaxis antibiótica

Fecha de la prueba: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_, a las \_\_\_\_\_