



## Preparación para Urografía Solución evacuante BOHM

PARTE DE **Bupa**

Para la realización correcta de la exploración prescrita por su médico y la posterior interpretación de la misma por parte del radiólogo, resulta imprescindible seguir estas indicaciones para que el día de la prueba su intestino esté limpio.

Esta preparación **no** podrá ser administrada a pacientes con **insuficiencia cardíaca o con insuficiencia renal grave**.

<b>48 horas antes de la prueba</b>	Sí puede tomar: <b>Dieta pobre en residuos</b>	Arroz y pasta, huevo, caldos, carne y pescado a la plancha o hervido, quesos duros, biscotes o galletas sin fibra, pan tostado, zumos y caldos filtrados, té, café y bebidas sin burbujas.
	No puede tomar	Ensaladas, verduras y legumbres, frutas, patatas, fécula, carnes y pescados en salsa o guisados, embutidos, pan, aceites, leche ni productos lácteos, grasas, pasteles, chocolate y bebidas con gas.
<b>24 horas antes de la prueba hasta 6 horas antes de la prueba</b>	Sí puede tomar: <b>Solo dieta líquida</b>	Aguas, caldos filtrados, zumos colados, infusiones, té, café y bebidas sin burbujas
<b>6 horas antes de la prueba</b>	<b>Ayuno total</b>	No tomará ni líquidos, incluyendo el agua.

### Instrucciones de la toma

A las **18:00 horas del día anterior a la exploración**, comenzará a tomar la Solucion Evacuante Bohm® (Laxante potente) a un ritmo aproximado de un sobre cada 20 minutos, hasta los 12 sobres. Esta solución está **CONTRA-INDICADA** en pacientes con obstrucción o perforación gastro-intestinal conocida o sospechada, íleo, retención gástrica, úlcera aguda gástrica, enfermedad intestinal inflamatoria crónica o megacolon.

Así mismo en personas de edad avanzada o mal estado general se ha de consultar con el radiólogo antes de indicar dicha solución.

El mismo día de la exploración guardará 6 horas en ayunas (ni líquidos), antes de la hora de citación.

Paciente: \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Fecha de la cita: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_